

BRIEF PSYCHIATRIC RATING SCALE

CARTELLA CLINICA N.....

COMPILATORE DATA DI COMPILAZIONE.....

OSPITE..... ETA'

DIAGNOSI (formulare una o più delle seguenti)

Secondo il DSM-IV.....

Secondo l'ICD-10.....

Sorgenti di informazione consultate per l'intervista (segnare tutte le fonti utilizzate)

- intervista con il paziente ed osservazione durante l'intervista
- familiari e/o conoscenti
- operatori sanitari
- osservazioni e colloqui con il paziente effettuati da valutatore al di fuori dell'intervista
- altre sorgenti di informazioni (specificare.....)

Periodo di riferimento scelto(in giorni: ad esempio 2 settimane = 14 gg).....

Modalità di integrazione della frequenza e gravità dei sintomi:

- 1 punteggio medio
- 2 punteggio del periodo peggiore
- 3 2 punteggi, uno medio e uno per il periodo peggiore
- 4 2 punteggi, uno per il periodo immediatamente precedente il ricovero o il contatto con il servizio, l'altro per il periodo precedente

Da compilare alla fine:

Giudizio di validità della valutazione(1=per niente; 5=molto attendibile)

Motivi di un'eventuale difficoltà nella valutazione(segnare tutti i motivi presenti):

- Sintomi indotti da farmaci
- Possibile sottostima dei sintomi per mancanza di una buona relazione
- Possibile sottostima dei sintomi per la presenza di un quadro di tipo negativo
- Mancanza di collaborazione da parte del paziente
- Presenza di disturbi formali del pensiero
- Altro(da specificare).....

FIRMA.....

BRIEF PSYCHIATRIC RATING SCALE

BRIEF PSYCHIATRIC RATING SCALE

	SINTOMI	Non valutato	Non presente	Molto lieve	Lieve	Moderato	Moderato severo	Severo	Estrem. severo
		0	1	2	3	4	5	6	7
1	Preoccupazione somatica								
2	Ansietà								
3	Ritiro emotivo								
4	Disorganizzazione concettuale								
5	Sentimenti di colpa								
6	Tensione								
7	Manierismi								
8	Grandiosità								
9	Umore depresso								
10	Ostilità								
11	Sospettosità								
12	Allucinazioni								
13	Rallentamento motorio								
14	Mancanza di cooperazione								
15	Contenuti insoliti del pensiero								
16	Appiattimento affettivo								
17	Eccitamento								
18	Disorientamento								

Punteggio totale.....

1. **Preoccupazione somatica:** preoccupazione per la salute fisica, paura di malattia fisica, ipocondria
2. **Ansietà:** Apprensione, paura, iperpreoccupazione per il presente o il futuro, mancanza di serenità
3. **Ritiro emotivo:** mancanza di interazione spontanea, isolamento, incapacità nella relazione con gli altri.
4. **Disorganizzazione Concettuale:** processi di pensiero confusi, sconnessi, disorganizzati.
5. **Sentimenti di colpa:** biasimo di se stessi, vergogna, rimorso per il comportamento passato.
6. **Tensione:** manifestazioni fisiche e motorie di nervosismo, iper-attivazione.
7. **Manierismi e postura:** comportamento motorio innaturale, particolare, bizzarro(esclusi i tic)
8. **Grandiosità:** opinione di sé esagerata, arroganza, convinzione di poteri e abilità straordinari.
9. **Umore depresso:** dolore, tristezza, disappunto, pessimismo.
10. **Ostilità:** animosità, ira, belligeranza, sdegno per gli altri.
11. **Sospettosità:** sfiducia, credenza che gli altri agiscano malvagiamente o con intento discriminatorio.
12. **Comportamento allucinatorio:** percezione senza la normale corrispondenza con lo stimolo esterno.
13. **Rallentamento motorio:** movimento o eloquio rallentato ed indebolito, riduzione del tono corporeo.
14. **Assenza di cooperazione:** resistenza, chiusura, rigetto dell' autorità.
15. **Contenuti di pensiero inusuali:** contenuto del pensiero inusuale, strano, particolare, bizzarro.
16. **Appiattimento affettivo:** tono emotivo ridotto, riduzione della normale intensità dei sentimenti.
17. **Eccitamento:** tono emotivo innalzato, agitazione, reattività aumentata.
18. **Disorientamento:** confusione o mancanza di associazioni appropriate alla persona, al luogo o al tempo.

(Overall J,Gorham D: *Brief Psychiatric Rating Scale*.Psychol Reports,1962;10:799-812)
 (Roncone R,Ventura J,et al: Reliability of an Italian standardized and expanded Brief Psychiatric Rating Scale(BPRS 4.0)in raters with high vs. low clinical experience.Acta Psychiatrica Scand 1999 Sep;100(3):229-36).